

Uwzględniając postać $\varphi_i(x)$ mamy

$$\left\{ \begin{array}{l} na_1 + \left[\sum_{j=1}^n x_j \right] a_2 + \left[\sum_{j=1}^n x_j^2 \right] a_3 = \sum_{j=1}^n y_j \\ \left[\sum_{j=1}^n x_j \right] a_1 + \left[\sum_{j=1}^n x_j^2 \right] a_2 + \left[\sum_{j=1}^n x_j^3 \right] a_3 = \sum_{j=1}^n y_j x_j \\ \left[\sum_{j=1}^n x_j^2 \right] a_1 + \left[\sum_{j=1}^n x_j^3 \right] a_2 + \left[\sum_{j=1}^n x_j^4 \right] a_3 = \sum_{j=1}^n y_j x_j^2 \end{array} \right.$$

Dowolne "m": Być średniokwadratowa
G(a_1, \dots, a_m) = $\sum_{j=1}^m \left[\sum_{k=1}^m a_k \varphi_k(x_j) - y_j \right]^2$.
gdzie:

$$\varphi_1(x) = 1, \varphi_2(x) = x, \dots, \varphi_m(x) = x^{m-1}$$

a m - liczba punktów empirycznych.

Analogiczne podejście prowadzi do układu m równań z m niewiadomymi

$$\sum_{k=1}^m a_k \left[\sum_{j=1}^n x_j^{i+k-2} \right] = \sum_{j=1}^n y_j x_j^{i-1}, \quad i = 1, 2, \dots, m$$